

Oversikt over hvilke prøver som bør dyrkes anaerobt

- Dype sårprøver
- Bittsår
- Abscess
- Karbunkel/furunkler/furunkelaspirat
- Cyste
- Byll

- Spinalvæsker
- Leddvæske/synovialvæske/bursavæske

- Galle
- Abdominalvæske/ascitesvæske
- Pleuravæske/thoraxvæske
- Pericardvæske

- Biopsier/vevsprøver/benbiter

- Mellomøre/indre øre
- Prøver tatt ved aspirasjon fra bihulene/Sinusitt

- Kjertler (minus analsekker)
- Aterom
- Empyem

- Fostervann/amnionvæske
- Placenta

- Dialysevæske
- "Blodkultur"

Generelt:

Aspirater fra serøse huler.

Anaerob dyrkning anbefales ikke utført på følgende prøvemateriale, men unntak kan forekomme avhengig av den kliniske problemstilling:

- Bronkialskyllvæske/BAL
- Ekspektorat, naso-og endotrakeal-aspirat
- Penselprøver fra nasopharynx, hals, munnslimhinne
- Penselprøver fra overfladiske sår og ulcera
- Penselprøver fra urethra, vagina og cervix
- Fæces – med unntak for *Clostridium spp.* påvisning
- Urin og kateterurin
- Fistler

Kilde: Strategirapport nr. 23-2009 Anaerob diagnostikk